

东北产蔷薇科木本植物资料

聂绍荃 任步钧

MATERIALS FOR ROSACEAE OF NORTH-EASTERN CHINA

Nie Shao-quan Jen Bu-jun

宁安山楂 (新变种) 山楂混子 (宁安) 图

Crataegus maximowiczii Schneid. var. *ninganensis* S. Q. Nie
et B. J. Jen, var. nov.

Differt a typo (var. *maximowiczii*) stipulis margine glandulifero-serratis; calycis post anthesin persistentibus et pubescentibus (nec glabris); pedunculis et pedicellis glabris (nec pubescentibus). Affinis *C. sanguinea* Pall. differt stipulis margine glandulifero-serratis; calycis post anthesin persistentibus et pubescentibus (nec glabris); gemmis cinero-brunneis (nec purpureo-brunneis vel purpureo-rubris).

本新变种与原变种 (var. *maximowiczii*) 的主要区别为: 托叶锯齿有腺点; 果实的宿萼有柔毛 (非无毛); 总花梗与花梗无毛 (非有柔毛)。本新变种与辽宁山楂 (*C. sanguinea* Pall.) 也相近, 但托叶锯齿有腺点; 果实的宿萼有柔毛 (非无毛); 冬芽为灰褐色 (非紫褐色或紫红色)。

聂绍荃: 黑龙江, 哈尔滨, 东北林学院 (North-Eastern Forestry Institute, Harbin, Heilongjiang)。

任步钧: 黑龙江, 哈尔滨, 黑龙江森林植物园 (Heilongjiang Arboretum, Harbin, Heilongjiang)。

黑龙江 (Heilongjiang): 宁安 (Ningan), 镜泊湖 (Jingpo Hu), 海拔 400—500 米, 河岸或沟谷杂木林内, 18 VI, 1980, 聂绍荃 (Nie Shao-quan) 289 (模式, 存东北林学院植物标本室。Typus, in Herb. North-East. Inst. Forest. conserv.); 黑龙江省森林植物园栽培, VI, 1979, 任步钧 222。

锦花郁李 (新变种)

Cerasus nakai (Lev.) Bar. et Liou var. *porphyrea* Takenouch ex S. Q. Nie, var. nov.

Cerasus nakai (Lev.) Bar. et Liou var. *porphyrea* Takenouch in sched.

Differ a typo (var. *nakai*) floribus porphyreis (nec rubellis), pedicellis 5—7mm longis (nec 2—3cm longis).

本新变种与原变种 (var. *nakai*) 的区别为: 花紫色 (非粉红色), 小花梗长 5—7 毫米 (非 2—3 厘米)。

辽宁 (Liaoning): 凤凰山 (Fenghuangshan), 西台地, 海拔 200 米, 11 V, 1950, 竹内亮 (Takenouch) 1283 (模式, 存长春市, 东北师范大学植物标本室。Typus, in Herb. North-East. Normal univ. conserv.).

重瓣榆叶梅 (新组合)

Amygdalus triloba (Lindl.) Ricker var. *plena* (Dipp.) S. Q. Nie, comb. nov.

Prunus triloba Lindl. var. *plena* Dipp. Handb. Laubh., 3: 608 1893, — *Cerasus triloba* (Lindl.) Bar. et Liou var. *plena* (Dipp.) Bar. et Liou, 东北木本植物图志, 326, 1955.

黑龙江 (Heilongjiang): 哈尔滨 (Harbin), 1979 年 6 月, 任步钧 348 号 (标本存东北林学院植物标本室)。

辽宁 (Liaoning): 沈阳 (Shenyang), 1979 年 9 月, 任步钧 (标本存地同上)。

截叶榆叶梅 (新组合)

Amygdalus triloba (Lindl.) Ricker var. *truncata* (Kom.) S. Q. Nie, comb. nov.

Prunus triloba Lindl. var. *truncata* Kom. in Act. Hort. Petrop. 539, 1903; — *Cerasus triloba* (Lindl.) Bar. et Liou var. *truncata* (Kom.) Bar. et Liou, 东北木本植物图志, 326, 1955.

辽宁 (Liaoning): 沈阳 (Shenyang), 1955 年 6 月, 王战 2231 号
(标本存中国科学院林业土壤研究所标本室)。

黑龙江 (Heilongjiang): 哈尔滨 (Harbin), 1951 年 7 月, 刘慎谔
197 号 (标本存放地点同上)。

重瓣麦李 (新组合)

Cerasus glandulosa (Thunb.) Lois f. *albi-plena* (Koehna) S.
Q. Nie, comb. nov. — *Prunus glandulosa* Thunb. f. *albi-plena*
Koehna in Sargent. Pl. Wilson 1: 264, 1912.

黑龙江 (Heilongjing): 哈尔滨 (Harbin), 1979 年 6 月, 任步钧 226
号 (标本存黑龙江省森林植物园)。

_____ . . . _____



图 宁安山楂 *Crataegus maximowiczii* Schneid. var. *ninganensis* S. Q. Nie et B. J. Jen.
1. 果枝, 2. 花, 3. 花萼。